A-S[alvadori]
Uccelli
no date

HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

43802

GIFT OF

Outram Bangs

January 25, 1916.

JAN 25 1916

43802

Outram Bangs
with the Author's
compliments

ESTRATTO DAL VOLUME I°

DELL'OPERA

IL RUWENZORI

Relazioni scientifiche

T. SALVADORI

Uccelli

ULRICO HOEPLI
MILANO
LIBRAIO
DELLA REAL CASA

T. SALVADORI

Uccelli.

Gli uccelli dell'Uganda ci sono già noti per le ricerche di molti esploratori e per i numerosi lavori che intorno alle collezioni ornitologiche da essi riportate od inviate, sono stati pubblicati. Uno degli ultimi lavori è quello dello Sharpe intorno alle collezioni fatte da Sir Harry Johnston e dal suo assistente Mr. Walter G. Dogget (1).

Una lista quasi completa degli uccelli dell'Uganda, fatta da Mr. Chubb del Museo Britannico, si trova nella grande opera « The Uganda Protectorate » del Johnston; in quella lista sono enumerate 771 specie di uccelli, e molte altre sono state aggiunte posteriormente.

Nel capitolo di prefazione alla seconda edizione della medesima opera (1904) sono menzionate altre 38 specie dell'Uganda.

Gli uccelli raccolti dai componenti la spedizione del Duca degli Abruzzi ammontano a soli 45 esemplari appartenenti a 36 specie delle quali 4 sono state descritte da me; queste non sono molto distinte, appartenendo a generi già noti e costituendo forme rappresentanti di altre proprie delle regioni vicine.

Talune specie (*Pratincola albofasciatus*, *Myrmecocichla nigra*, *Balearica gibberifrons*, *Anas sparsa*) sembrano nuove per l'Uganda.

1. **Cossypha heuglini** Hartl.

Rchnw. Vög. Afr. III, p. 758. — Chubb. in Johnston, The Uganda Protect. I, p. 436, n. 425 (1902).

a (1) ad. Naioma (Toro) 26 Maggio 1906 « Becco nero; piedi castani scuri » (*Roccati*).

L'esemplare suddetto corrisponde alla figura della *C. intermedia* (Cab.) v. d. Deck. Reis. III, T. XII.

---

(1) On the Collections of Birds made by Sir Harry Johnston K. C. B. in Equatorial Africa (Ibis, 1902, pp. 96-121).

2. **Pratincola albofasciatus** (Rüpp.).

Rchnw. Vög. Afr. III, p. 735.

a (3) ♂ Naioma (Toro) 29 Maggio 1906 « Becco, piedi ed occhi neri » (*Roccati*).

Il nero della gola non si estende sul petto, ma forse ciò deriva da imperfetta preparazione.

Non pare che questa specie fosse stata trovata nell' Uganda prima della spedizione del Duca degli Abruzzi.

3. **Myrmecocichla nigra** (Vieill.).

Rchnw. Vög. Afr. III, p. 706.

a ( ) ad. Fort Portal Luglio 1900.

Interamente nera, tranne le piccole e medie cupritrici delle ali bianche.

Anche questa specie sembra nuova per l'Uganda.

4. **Cisticola ambigua** Sharpe.

Bull. B. O. C. XI, p. 28 (1900). — Jacks. Ibis, 1901, p. 61. — Chubb. in Johnston Uganda Protect. I, p. 438 (1902).
Cisticola robusta nuchalis part., Rchnw. Vög. Afr. III. p. 555.

a ( ) ad. Fort Portal Luglio 1906.

Pileo rosso-castagno lievemente striato di scuro; dorso nericcio coi margini delle piume grigi; parti inferiori bianco-fulviccie; *remiganti senza l'area rossigna alla base esterna*, timoniere nere coll'apice bianchiccio, ma *senza macchia subapicale nera*.

Determinato dal D.r Reichenow come appartenente alla *Cisticola ambigua*.

5. **Anthoscopus roccatii** Salvad.

Salvad. Boll. Mus. Tor. N. 542, p. 2 (1906).

a ( ) Entebbe.

Supra cinereo-olivascens, fronte flavida, plumarum apicibus cinereo punctulatis, genis et gastraeo toto albo-flavidis; alis caudaque fuscis, plumarum marginibus albidis.

Long. tot. 82 mm., al. 52; caud. 30; rostri culm. 7; tarsi 14.

Un esemplare di Entebbe conservato nello spirito. Il D.r Reichenow crede che esso appartenga a specie nuova.

6. **Terpsiphone cristata** (Gm.)?

Chubb, in Johnston, Ug. Protect. I, p. 435, n. 378 (1902).
Tchitrea viridis (St. Müll.). — Rchnw. Vög. Afr. II, p. 504.

a ( ) Un maschio adulto.

Come qualche esemplare adulto dello Scioa esso ha il sottocoda dello stesso colore castagno della coda; le cuopitrici inferiori delle ali sono nere variegate di bianco; le ultime remiganti interne sono di colore castagno, la quale cosa non è negli esemplari adulti dello Scioa; i quali hanno quelle remiganti nere col vessillo esterno bianco.

Le due timoniere mediane bianche sono molto più larghe che non negli esemplari dello Scioa, la quale cosa mi fa dubitare che gli esemplari dell'Uganda possono appartenere ad una specie distinta.

7. **Cryptolopha alpina** Grant.

Bull. B. O. C. XVI, p. 117 (1906) (E. Ruwenzori).

a (10) ♂ Bugiungolo (m. 3800 Giugno) 1906.

Brunnea, capite saturatiore, dorso paullum virescente, supracaudalibus brunneo-olivaceis; fasciis superciliaribus rufis; corpore subtus brunneo, collo antico et subcaudalibus rufescentioribus; remigibus rectricibusque fuscis, exterius viridi-olivaceo marginatis; remigibus intus albo limbatis; rostro pedibusque fuscis, mandibula pallida.

Long. tot. mm. 128; al. 62; caud. 50: rostri culm. 11; tarsi 23.

Cryptolopha C. mackenzianae et C. dorcadichroae similis, sed major et gastraeo saturatiore et fere concolore, abdomineque medio minime albo diversa.

Esemplare determinato dal D.r Reichenow.

8. **Cinnyris stuhlmanni** Rchnw.

Vög. Afr. III, p. 488.

a (9) ♀ (an potius ♂ juv.?) Ghiacciaio Duvoni (m. 5190) Giugno 1906 « Becco, piedi ed occhi neri » (*Roccati*).

Esemplare giovane di colore olivastro, colla parte anteriore del collo con talune piume di color verde metallico superiormente, altre di color violetto più in basso ed altre finalmente rosse inferiormente.

La coda, alquanto graduata, ha le timoniere esterne più chiare all'apice e lievemente terminate di bianco.

Debbo la non facile determinazione di questo esemplare a W. R. Ogilvie-Grant del Museo Britannico.

9. **Cinnyris falkensteini** Fisch. & Rchnw.

Cinnyris venustus falkensteini, Rchnw. Vog. Afr. III, p. 474.

a ( ) ♂ ad. Fort Portal Luglio 1906.

10. **Pycnonotus layardi** Gurn.

Chubb. in Johnston. Ug. Prot. II, p. 436, n. 406. — Rchnw. Vög. Afr. III, p. 423.

a ( ) ad. Fort Portal Luglio 1906.

11. **Macronyx** sp.?

a ( ) juv. Fort Portal Luglio 1906.

Esemplare giovanissimo di difficile determinazione, ma, secondo il D.r Reichenow, pare appartenente al *M. croceus*. Tuttavia non si può escludere che non appartenga al *M. sharpei*, che manca del collare nero intorno alla gola, come si verifica nell'esemplare annoverato.

12. **Serinus sharpei** Neum.

Chubb. in Johnston. Ug. Prot. I, p. 441, n. 679. — Rchnw. Vög. Afr. III, p. 266.

a ( ) ad. Fort Portal Luglio 1906.

13. **Passer diffusus** (A. Smith).

Passer griseus (Vieill.). — Rchnw. Vög. Afr. III, p. 230.
Passer ugandae Rchnw. — Chubb. in Johnst. Ug. Prot. I, p. 441, n. 624.

a ( ) ♂ Butiti 1 Agosto 1906. « Occhi castani; becco e piedi nerastri » (*Roccati*).

Secondo il Reichenow, gli esemplari dell'Uganda apparterrebbero ad una forma distinta per le ali alquanto più lunghe e pel dorso di color rosso-bruno più vivo (*P. diffusus ugandae* Rchnw., Orn. Monatsb. 1899, p. 190).

14. **Coliopasser ardens** (Bodd.).

Rchnw. Vog. Afr. III, p. 135.
Penthetria ardens Chubb. in Johnston. Ug. Prot. I, p. 441, n. 644.

a (4) ♂ ad. Naioma (Toro) 26 Maggio 1906. « Occhi, piedi e becco neri » (*Roccati*).

15. **Urobrachya phoenicea** (Heugl.).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 441, n. 650. — Rchnw. Vög. Afr. III, p. 131.

a ( ) ad. Fort Portal Luglio 1906.

16. **Pyromelana nigrifrons** Böhm.

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 441, n. 654. — Rchnw. Vög. Afr. III, p. 122.

a (5) ♂ Naioma (Toro) 26 Maggio 1906. « Becco nerastro; piedi rosa scuro ». (*Roccati*).

17. **Lagonosticta ugandae** Salvad.

Boll. Mus. Tor. N. 542, p. 2 (1906).

a ( ) ad. Fort Portal Luglio 1906.

Lagonosticta L. congicae valde affinis, sed dorso alisque obscurioribus. Capite saturate cinereo, vinaceo tinto; collo antico, pectore lateribusque rubro-vinaceis; pectoris lateribus albo punctulatis; abdomine medio et subcaudalibus nigris; dorso alisque saturate brunneis; supracaudalibus rubro-vinaceis; subcalaribus et margine interno remigum sordide griseis; cauda fusca, rectricibus in pogonio externo rubro-vinaceo tinctis; rostro plumbeo; pedibus fuscis.

Long. tot. circa 96 mm.; al. 48; caud. 42.

Un esemplare di Fort-Portal, confrontato dal D.r Reichenow, ma forse non diverso dalla *L. congica* Sharpe.

18. **Estrelda astrild** (L.).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 442, n. 697, — Rchnw., Vög. Afr. III, p. 178.

a, *b* ( ) ad. Fort Portal Luglio 1906.

19. **Hyphantornis abyssinica** (Gm.).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 443, n. 723. — Rchnw. Vög. Afr. III, p. 57.

a (2) ♀ (an pot. ♂) Naioma (Torr) 26 Maggio 1906 « Becco corneo marrone; piedi marrone chiaro ». (*Roccati*).

20. **Lamprocolius glaucovirens** Elliot.

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 444, n. 758. — Rchnw. Vög. Afr. II, p. 693.

a ( ) ♂ (?) Entebbe. « Iride bianca, becco e piedi neri ». (*Gröber*).

21. **Corvultur albicollis** (Lath.).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I. p. 441, n. 771. — Rchnw. Vög. Afr. II, p. 640.

a (7) ♂ ad. Bugiungolo 3800 m. 12 Giugno 1906. « Becco nero coll'apice bianchiccio: piedi ed occhi neri ».

Si trova in tutta l'Uganda (*Roccati*).

22. **Lanius humeralis** Stanl.

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 438, n. 517. — Rchnw. Vög. Afr. II, p. 609.

a, *b* ( ) ♂♂ ad. Fort Portal.

23. **Cosmetornis vexillarius** (Gould).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 432, n. 244. — Rchnw. Vög. Afr. II, p. 371.

? *a*, *b* ( ) ♂ ♀ ad. Kiciamu Agosto 1906. « Occhi castani chiari; becco e piedi nerastri. Si trova in tutta l'Uganda » (*Roccati*).

24. **Melittophagus meridionalis** Sharpe.

Rchnw. Vög. Afr. II, p. 307.

a ( ) Fort Portal Luglio 1906.

25. **Bycanistes aloysii** Salvad.

Boll. Mus. Zool. Tor. n. 542, p. 1 (1906).

Bycanistes B. subquadrato Cab. *simillimus, sed tertio apicali rectricum duarum mediarum albo facile distinguendus.*

Niger et albus; capite, collo, dorso, pectore, lateribus, tectricibusque alarum nigris, viridi nitentibus: plumis laterum capitis, gulaeque grisco marginatis; dorso imo, supracaudalibus, abdomine medio, subcaudalibus, tibiisque albis; remigibus tribus anticis nigris, reliquis, parte basali nigra excepta, albis; rectricibus omnibus nigris, tertio apicali albo; rostro fusco-nigro, parte summa basali clypei alba.

Long. al. circa 350 mm.

a ( ) ♂ ad. Entebbe Agosto 1906. « Occhi castani mattone; piedi nerastri; becco nerastro coll'elmo superiormente bianco roseo ». (*Roccati*).

Esemplare adulto, simile alle figure del *B. subquadratus* Cab. Journ. f. Orn. 1880, pl. 1; Elliot, Mon. Bucerot. pl. XXVIII), tranne che una delle timoniere mediane (l'altra manca) non è interamente nera, ma ha l'apice per 90 millimetri bianca!

26. **Xylobucco aloysii** Salvad.

Boll. Mus. Zool. Tor. N. 542, p. 2 (1906).

Xylobucco X. *consobrino* (Rchnw.) *valde affinis, sed collo antico albescentiore, abdomine magis flavescente lateribusque distincte nigro-fasciolatis.*

Supra fascus, plumarum marginibus viridi-olivaceis; collo antico griseo-albido; gastraeo reliquo flavido, lateribus nigro-fasciolatis; subalaribus margineque interno remigum albis; remigibus rectricibusque fuscis, viridi-olivaceo limbatis; rostro nigro.

Long. tot. 115 mm., al. 61; caud. 47; rostri culm. 13; tarsi 15.

a ( ) Entebbe. Esemplare conservato nello spirito.

Esso è stato esaminato anche dal D.r Reichenow, che ha confermato essere esso differente dallo *X. consobrinus*.

27. **Chrysococcyx klaasi** (Steph.).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 433, n. 281. — Rchnw. Vög. Afr. II, p. 98.

a, *b* ad. Entebbe?

28. **Musophaga rossae** Gould.

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 433, n. 265. — Rchnw. Vög. Afr. II, p. 29.

a, *b* ( ) ♂ ♂ ad. Foresta dell'Ima, vicino a Fort-Portal Luglio 1906. « Occhi castani; piedi neri; becco giallo, rossastro alla base » (*Roccati*).

29. **Corythaeola cristata** (Vieill.).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 433, n. 266. — Rchnw. Vög. Afr. II, p. 26.

a ( ) ♀ ad. Entebbe.

« Becco rosso e giallo » (*Gröber*).

30. **Astur melanoleucus** (A. Smith).

Rchnw. Vög. Afr. I, p. 551.
Accipiter melonoleucus Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 430, n. 160.

a ( ) ♂ ad. Fort-Portal Luglio 1906.

« Becco corneo nericcio; occhi e piedi gialli. Catturato presso il vulcano spento Undere, vicino a Fort Portal ». (*Roccati*).

31. **Numida major** Hartl.

Numida ptilorhyncha part.. Rchnw. Vög. Afr. I, p. 445. — Chubb (nec. Licht.) in Johnst. Ug. Prot. I, p. 425, n. 24.
Numida ptilorhyncha major Neum. Journ. f. Orn. 1904, pp. 407-408. — Rchnw. op. cit. III, p. 812.

a ( ) ♂ ad. Kicumma Agosto 1905.

Simile ad un esemplare raccolto dall'Antinori presso Rosseres, conservato nel Museo di Torino.

La *N. ptilorhyncha* Lict. è stata recentemente divisa in sette forme, o sottospecie (*Journ. f. Orn.* 1904, p. 408).

L'esemplare suddetto sembra appartenere alla *N. ptilorhyncha major* Hartl. Abh. Ver. Brem. 1882, p. 216; confrontato con gli esemplari tipici dell'Abissinia, ne differisce realmente per minore sviluppo del ciuffo di rigidi peli alla base del becco, per minore altezza dall'elmo sul pileo, e per le dimensioni alquanto maggiori.

Tuttavia, secondo il D.r Reichenow, le varie forme della *N. ptilorhyncha* trapasserebbero gradatamente l'una nell'altra, ad eccezione della *N. somaliensis*, che sarebbe forma veramente distinta.

32. **Chalcopelia afra** (L.).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 426, n. 113. — Rchnw. Vög. Afr. I, p. 426; III, p. 811.

a ( ).

b ( ) Fort Portal Luglio 1906.

Macchie metalliche sulle ali di colore azzurro.

Piedi in un esemplare di color giallo, nell'altro di color rosso cupo.

Le diverse forme nelle quali è stata divisa questa specie, anche dopo i lavori dello Sharpe, dell' Erlanger e del Reichenow, mi sembrano insufficientemente caratterizzate.

33. **Ardea melanocephala** Vig. & Childr.

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 420, n. 115. — Rchnw. Vög. Afr. I, p. 380.

a ( ) ♂ ad. Fort Portal Luglio 1906.

b ( ) ♂ ad. Butiti 1 agosto 1906.

« Occhi gialli; becco nerastro; piedi neri ». (*Roccati*).

c ( ) ♀ juv. Luglio 1906. Catturato vicino alla foresta dell'Ima presso Fort Portal (*Roccati*).

« Occhi gialli; becco superiormente nerastro, inferiormente bianco-cenerino. Piedi nerastri ». (*Roccati*).

34. **Hagedashia hagedash** (Lath.).

Chubb, in Johnst. Ug. Prot. I, p. 428, n. 101.
Theristicus leucocephalus (Gm.). — Neum. Journ. f. Orn. 1898, p. 277.
Theristicus hagedash Rchnw. Vög. Afr. I, p. 325.

a ( ) ♂ ♂ Fort Portal Luglio 1906.

« Becco nerastro, rosso mattone lungo il culmine; piedi nerastri, dita rosse; occhi bianco-paglierino » (*Roccati*).

b ( ) ♀ Butiti 1 Agosto 1906.

Il secondo esemplare, non al tutto adulto, ha meno distinte e brunastre le due fascie sui lati della gola, che nel primo sono bianche.

Le timoniere del secondo esemplare hanno riflessi più verdi che non azzurri.

35. **Balearica gibbericeps** Rchnw.

Rchnw., Journ. f. Orn. 1891, p. 126. — Neum. Journ. f. Orn. 1898, p. 270.
Balearica regulorum gibbericeps Rchnw. Vög. Afr. I, p. 266.

a, *b* ( ) ♂, ♀ Butiti 2 Agosto 1906.

« Bargigli rosso mattone; lati della testa bianchi; becco e piedi neri; occhi bianco-cenerini. Si trova in tutta l'Uganda » (*Roccati*).

Specie protetta nell'Uganda, e che non è lecito uccidere.

La famiglia delle Gru non è rappresentata nella lista degli Uccelli dell'Uganda fatta dal Chubb.

36. **Anas sparsa** Smith.

Rchnw. Vög. Afr. I, p. 115.

a (6) ♀ Bugiongolo (m. 3800) 10 Giugno 1906.

« Becco [giallo] corneo e nero; occhi castani; piedi gialli colla membrana interdigitale nera » (*Roccati*).

Specie di vasta diffusione, dalla Colonia del Capo fino all'Abissinia, e tuttavia nuova per l'Uganda.